| | | |
|---|---|---|
| | Código: ID-RFI | Aprovado por: LILIAN SIMONE |
| | | Emitido por: DIOGO MARTINS |
| Informação Documentada | Título: Registro da Ficha de Indicador | |

| Nome da Unidade | UPA | Unidade de Medida | MINUTOS |
|---|---|---|---|

| Meta | Indicador | Forma de Medição (cálculo) |
|---|---|---|
| < = 60 min | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico / Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica |




| | |
|---|---|
| Periodicidade de Avaliação | Mensal |
| Area Responsável | Coordenação de Enfermagem da UPA |
| Responsável pela Coleta de Dados | Coordenação de Enfermagem da UPA |
| Responsável pela Analise de Dados | Coordenação de Enfermagem da UPA |
| Referencial Comparativo | |
| Versão | Junho de 2023 |
| Última Atualização: 04/07/2023 | |

**Justificativa**

**Ao analisar o indicador referente ao mês de junho de 2023, verificamos que foram abertos 16 protocolos de Sepse na unidade.**

**Análise Crítica**

***O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse são de 60 minutos, conforme meta contratual.***

**Neste mês a administração foi realizada em 16 *minutos* desde o ínicio do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiotico.**

***Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 60 minutos.***

***Indicador classificado como ótimo.***

***A tendência do indicador favorável*, com o objetivo de melhoria no tempo da administração do antibioticoterapia conforme protocolo.**

**Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais ( SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.**

**Tempo de administração:**

**- Tempo até 30 minutos - 16 pacientes;**

**- Tempo de 31 a 60 minutos - 00 pacientes**

**- Tempo superior a 1 hora - 00 paciente**

,

**1- Orientações continuas sobre abertura precoce do protocolo de Sepse em com a equipe de enfermagem e agilidade na condução para que o protocolo seja efetivo.**

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico | 380 | 612 | 666 | 399 | 364 | 254 | | | | | | |
| Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | 34 | 31 | 28 | 28 | 28 | 16 | | | | | | |

| Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Meta | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Resultado | 11 | 20 | 24 | 14 | 13 | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |