

	Hospital Estadual Getúlio Vargas	Unidade de Medida	Lesão por Pressão/ 100 pacientes internados														
Perspectiva	Diretriz	Fonte dos Dados															
Processos.	Mensurar a qualidade da assistência prestada ao paciente Objetivo Monitorar o perfil de pacientes da unidade e a eficácia das ações implementadas para a prevenção das Lesões por pressão, com foco na segurança do paciente	Planilha de Indicadores															
Meta	Indicador	Forma de Medição (cálculo) Nº de pacientes internados com Lesão por pressão Número de pacientes internados do período															
2,5	Incidência de casos de Lesão por Pressão	Periodicidade de Avaliação Mensual															
<table border="1"> <caption>Data for Line Chart: Incidência de casos de Lesão por Pressão</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Resultado (Casos/100 pacientes)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>-2 jan/23</td><td>5,49</td></tr> <tr><td>fev/23</td><td>4,51</td></tr> <tr><td>mar/23</td><td>4,62</td></tr> <tr><td>abr/23</td><td>7,01</td></tr> <tr><td>mai/23</td><td>4,92</td></tr> <tr><td>jun/23</td><td>4,88</td></tr> </tbody> </table>				Mês	Resultado (Casos/100 pacientes)	-2 jan/23	5,49	fev/23	4,51	mar/23	4,62	abr/23	7,01	mai/23	4,92	jun/23	4,88
Mês	Resultado (Casos/100 pacientes)																
-2 jan/23	5,49																
fev/23	4,51																
mar/23	4,62																
abr/23	7,01																
mai/23	4,92																
jun/23	4,88																
Definição: Relação percentual entre o número de pacientes que desenvolveram novos casos de Lesões por pressão durante a internação e o número de pacientes-dia de determinado período. 2.1 Pacientes que desenvolveram novos casos de lesão por pressão: Pacientes que durante a internação desenvolveram lesão localizada na pele e/ou tecido ou estrutura subjacente, geralmente sobre uma prominência óssea, resultante de pressão isolada ou de pressão combinada com fricção e/ou cisalhamento. São consideradas as lesões em qualquer um dos estágios de desenvolvimento. 2.2 Paciente-dia: Unidade de medida que representa a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. O dia da saída só será computado se a saída do paciente ocorrer no mesmo dia da internação. 2.3 Não considerar: Lesões por pressão já existentes na data da internação do paciente																	
Versão 1 Última Atualização 05/07/2023																	

No mês de junho registramos um total de **50 pacientes internados com Lesão por Pressão**, num universo de **1024 pacientes internados no período** (24 pacientes adquiriram as LPPs na nossa unidade e 26 pacientes foram admitidos de outras unidades de saúde ou da residência com a lesão instalada). Em comparação ao mês de maio, obtivemos uma **redução de 5,66% em relação ao número absoluto de pacientes** (53 pacientes em maio e 50 em junho).

Os 24 pacientes que desenvolveram novas LPP, foram registrados nos seguintes setores:

- CTIs - 17 eventos para 77 pacientes internados no período;
- Ortopedia - 02 eventos para 147 pacientes internados no período;
- Clínica Médica - 04 eventos para 77 internados no período;
- Clínica Cirúrgica - 01 evento para 14 internados no período;

Ao analisarmos o indicador no que tange aos novos casos de LPP, observamos uma redução de 11,11% no número de eventos no período quando compararmos ao mês de maio (27 para 24).

Quanto ao risco pela escala de Braden, 16 pacientes apresentavam risco muito elevado para o desenvolvimento das lesões (Braden entre 6 e 9); 04 apresentavam risco elevado; 02 apresentavam risco moderado e 02 risco baixo. Dos 24 pacientes, 13 faziam uso de drogas vasoativas e apresentavam instabilidade hemodinâmica ao manuseio prejudicando as mudanças de decúbito (pacientes dos CTIs Ad). As demais lesões desenvolvidas ocorreram devido à resistência dos pacientes às mudanças de decúbito devido a dor intensa / resistência (08 pacientes), e também à falha nas alternâncias de decúbito a cada 2 horas, conforme o protocolo institucional (02 pacientes). Tivemos 01 caso relatado por cisalhamento devido a agitação do paciente. Das lesões adquiridas em nossa unidade, 08 eram de estágio I, as outras 16 eram de estágio II, onde percebemos ainda dificuldade para identificar precocemente as lesões de primeiro estágio. Outro ponto importante a ser observado, se refere a classificação dos pacientes sob o ponto de vista do cuidado, que retrata o grau de dependência da assistência de enfermagem através do score de Fuglum, onde tivemos um número expressivo de pacientes que demandam muitas horas de assistência direta, refletindo a complexidade do cuidado. A soma de pacientes com elevado grau de dependência foi de 64,59%, sendo Cuidados de alta dependência 32,91%, Cuidados Semi-intensivos 14,14% e Cuidados Intensivos 17,54%.

Com relação aos desfechos dos pacientes que apresentaram novos casos de LPP, informamos:

- 10 pacientes receberam alta;
- 07 pacientes continuam internados (até o dia da análise);
- 07 pacientes evoluíram a óbito, contudo, sem associação às LPPs (sem protocolos de sepse de foco cutâneo e sem score News aberto);

Com relação aos pacientes admitidos com as LPPs já instaladas, registramos 26 casos em nosso hospital oriundos das residências e de outras unidades de saúde (no mês anterior o dado foi o mesmo 26). Estas LPPs são monitoradas e tratadas de acordo com o protocolo institucional. Como não temos gerenciamento sobre as mesmas, realizamos orientações aos familiares quanto a prevenção, cuidados com a pele e lesões. O Monitoramento das admissões no que tange às avaliação das integridades cutâneas com objetivo de evitar a subnotificação dos eventos de LPP, continua sendo realizado, onde constantemente desenvolvemos treinamentos com foco em prevenção, objetivando a redução dos novos casos.

As lesões por pressão são multifatoriais e exigem dos gestores medidas de contenção, impedindo o surgimento das mesmas, contudo, as condições clínicas dos pacientes tem impactado diretamente no plano terapêutico de Enfermagem e nos principais cuidados como a mudança de decúbito a cada 2 horas. A mitigação destes eventos, continua sendo um grande desafio para as lideranças envolvidas no processo do cuidado.

Considerando a série histórica, a tendência deste Indicador é manter-se favorável para o próximo mês.


Ação de Melhoria

- 1- Manter o monitoramento das alternâncias de decúbito a cada 2 horas;

Compilação de dados - Indicador

Indicador: Incidência de casos de Lesão por Pressão

	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Resultado
Metas: 15	15												
Nº de pacientes internados com Lesão por pressão	56	43	53	77	53	50							332
Número de pacientes internados do período	1037	954	1146	1099	1078	1024							6338
Fórmula: Dividir numerador pelo denominador e multiplicar por 100	5,40	4,51	4,62	7,01	4,92	4,88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



Anexos:

Anexos: