



| | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
|  | | Código: ID-RFI | Aprovado por: LILIAN SIMONE |
| | | Emitido por: DIOGO MARTINS | |
| Informação Documentada | | Título: Registro da Ficha de Indicador | |
| Nome da Unidade | UPA | Unidade de Medida | MINUTOS |
| Meta | Indicador | Forma de Medição (cálculo) | |
| < = 60 min | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico / Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | |
|  | | Periodicidade de Avaliação Mensal Área Responsável Coordenação de Enfermagem da UPA Responsável pela Coleta de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Responsável pela Análise de Dados Coordenação de Enfermagem da UPA Referencial Comparativo Versão Julho de 2023 Última Atualização: 04/07/2023 | |
| Justificativa | | | |
| <p>Ao analisar o indicador referente ao mês de julho de 2023, verificamos que foram abertos 20 protocolos de Sepse na unidade.</p> | | | |
| Análise Crítica | | | |
| <p><i>O início oportuno da administração da antibioticoterapia no protocolo de sepse são de 60 minutos, conforme meta contratual.</i></p> <p>Neste mês a administração foi realizada em 20 minutos desde o início do seguimento do protocolo de sepse até o início da administração do antibiótico.</p> <p><i>Ficamos com o indicador dentro da meta contratual com 60 minutos.</i></p> <p><i>Indicador classificado como ótimo.</i></p> <p>A tendência do indicador favorável, com o objetivo de melhoria no tempo da administração do antibioticoterapia conforme protocolo.</p> <p>Todos os protocolos abertos tiveram 02 ou mais sinais (SIRS, Sepse ou Disfunção Orgânica), com origem comunitária, onde tivemos como focos: pulmonar, urinário, pele e partes moles, indeterminado.</p> <p>Tempo de administração:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempo até 30 minutos - 15 pacientes; - Tempo de 31 a 60 minutos - 05 pacientes - Tempo superior a 1 hora - 00 paciente | | | |
| 1 | | | |
| <p>1- Orientações contínuas sobre abertura precoce do protocolo de Sepse em com a equipe de enfermagem e agilidade na condução para que o protocolo seja efetivo.</p> | | | |

| | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---------|-----------|-------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|----------|
| Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico | 380 | 612 | 666 | 399 | 364 | 254 | 445 | | | | | |
| Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica | 34 | 31 | 28 | 28 | 28 | 16 | 20 | | | | | |

| | Início oportuno de antibioticoterapia na sepse | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------|-------|------|-------|-------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Mês | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maiο | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
| Meta | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Resultado | 11 | 20 | 24 | 14 | 13 | 16 | 22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |