

| <b>Tabela 01 - Fluxo de Pacientes na Unidade no Período – Todas as Internações no Período *</b> | <b>N</b> | <b>%</b> |
|---|----------|----------|
| Total de internações na unidade no período (n) *  | 238      |          |
| Internações do período anterior (n, %)  | 50       | 21,01    |
| Internações novas (n, %)  | 188      | 78,99    |
| Reinternações na unidade no período (n, %) **   | 20       | 10,64    |
| Número total de saídas da unidade (altas + óbitos) (n, %)                                       | 188      | 78,99    |
| Pacientes ainda internados no final do período (n, %)   | 50       | 21,01    |
| Reinternações na UTI (n,%) **   |          |          |
| <24h  | 0        | 0,00     |
| <48h  | 0        | 0,00     |
| <72h  | 2        | 1,39     |
| Número de Paciente-Dia (n) **   | 1.575    |          |
| Taxa de ocupação (%) ***  |          | 90,73    |
| Duração média da internação (dias) #  | 8,38     |          |
| Índice de renovação ou giro de rotatividade ##  |          | 3,36     |
| Índice do intervalo de substituição ###   |          | 0,86     |
| Desfecho na Unidade (n, %)  |          |          |
| Alta  | 144      | 60,50    |
| Óbito   | 44       | 18,49    |
| NI  | 50       | 21,01    |
| Desfecho no hospital (n, %)   |          |          |
| Alta  | 96       | 66,67    |
| Óbito   | 48       | 33,33    |

\* Este relatório inclui todos os eventos ocorridos no total de pacientes que permaneceram na(s) unidade(s) (i.e., internações novas e pacientes que já se encontravam internados na unidade) durante o período.

\*\* Reinternações na unidade - Numerador: reinternações novas na unidade; denominador: internações novas na unidade.

\*\* Reinternações na UTI: Numerador: Reinternações na UTI em 24h, 48h ou 72h após a alta da UTI; Denominador: Altas da UTI;

\*\*\* Taxa de ocupação: número de pacientes-dia / número de leitos dia no período.

# Duração média da internação: número de pacientes-dia / número de saídas (altas + óbitos) da unidade no período.

## Índice de renovação ou giro de rotatividade: número de saídas (altas e óbitos) / número de leitos da(s) unidade(s) no período.

### Índice intervalo de substituição: (porcentagem de desocupação x duração média da internação) / taxa de ocupação na(s) unidade(s) no período.

| <b>Tabela 02 - Seguros Saúde – Todas as Internações Novas na Unidade *</b> | <b>N</b> | <b>%</b> |
|--|----------|----------|
| Internações novas (n)  | 188      |          |
| Seguro Saúde / Convênio (n, %)   |          |          |
| SUS (Sistema Único de Saúde)   | 188      | 100,00   |

\* Novas internações na unidade durante o período.

| <b>Tabela 03 - Principais Características Clínicas à Internação na Unidade - Todas as Internações</b> | <b>N</b> | <b>%</b> |
|---|----------|----------|
| Internações novas (n)   | 188      |          |
| Sexo (n, %)   |          |          |
| Masculino   | 102      | 54,26    |
| Feminino  | 86       | 45,74    |
| Idade (anos) (média ± DP)   | 60,10    | 20,21    |
| Idade (anos) (mediana)  | 63       |          |
| Faixas Etárias (n, %)   |          |          |
| < 18  | 4        | 2,13     |
| 18 - 44   | 43       | 22,87    |
| 45 - 64   | 53       | 28,19    |
| 65 - 80   | 60       | 31,91    |
| > 80  | 28       | 14,89    |
| Tipo de Internação (n, %)   |          |          |
| Clínico   | 134      | 71,28    |
| Cirurgia eletiva  | 32       | 17,02    |
| Cirurgias de urgência / emergência  | 17       | 9,04     |
| Origem (n, %)   |          |          |
| Enfermaria/Quarto   | 25       | 13,30    |
| Emergência  | 126      | 67,02    |
| Centro cirúrgico  | 26       | 13,83    |
| Outra UTI/UCI do seu hospital   | 8        | 4,26     |
| Transferência de outro hospital/instituição   | 1        | 0,53     |
| Outros  | 2        | 1,06     |
| Principais medidas de suporte à internação (n, %)   |          |          |
| Ventilação Mecânica (VM)  | 49       | 26,06    |
| Suporte renal   | 4        | 2,13     |
| Aminas  | 56       | 29,79    |
| Infecção à internação na unidade (n, %)   | 6        | 3,19     |
| Sepse e choque séptico no Dia 1 (n,%)   |          |          |
| Somente sepsse no D1 de UTI   | 9        | 4,79     |
| Somente choque séptico no D1 de UTI   | 18       | 9,57     |
| Sepsse e choque séptico no D1 de UTI  | 22       | 11,70    |
| Escores de prognóstico à internação (média ± DP)  |          |          |
| Média ± DP  | 44,70    | 11,53    |
| Mediana   | 44       |          |
| Maior valor   | 74       |          |
| Menor valor   | 19       |          |
| Categorias de Gravidade   |          |          |
| Baixa   | 0        | 0,00     |
| Intermediária   | 0        | 0,00     |
| Elevada   | 0        | 0,00     |
| Muito elevada   | 0        | 0,00     |

\* Novas internações na unidade durante o período.

**Tabela 04 - Diagnóstico Mais Frequente - Internações Clínicas \***

|  | N   | %     |
|--|-----|-------|
| <b>Categorias de diagnóstico - Internações clínicas (n, %)</b>               | 551 |       |
| Neurológico / psiquiátrico   | 112 | 20,33 |
| Infecção / sepse   | 111 | 20,15 |
| Trauma não cirúrgico   | 70  | 12,70 |
| Respiratório (exceto sepse / infecção)                                       | 57  | 10,34 |
| Outros / diversos  | 50  | 9,07  |
| Cardiovascular   | 47  | 8,53  |
| Endócrino / metabólico   | 25  | 4,54  |
| Renal  | 19  | 3,45  |
| Hematológico   | 15  | 2,72  |
| Gastrointestinal   | 13  | 2,36  |
| Fígado, Vias Biliares, Baço e Pâncreas                                       | 11  | 2,00  |
| Hérnias e defeitos da parede abdominal                                       | 6   | 1,09  |
| Parada cardiorrespiratória   | 4   | 0,73  |
| Tumores e complicações oncológicas   | 3   | 0,54  |
| Morte encefálica   | 2   | 0,36  |
| Cuidados paliativos  | 2   | 0,36  |
| Choque (exceto sepse)  | 2   | 0,36  |
| Doenças alérgicas, inflamatórias, auto-imunes e colagenoses                  | 1   | 0,18  |
| Doenças osteoarticulares e de partes moles                                   | 1   | 0,18  |
| <b>Diagnósticos principais mais frequentes - Internações clínicas(n, %)</b>  | 138 |       |
| Trauma de membros ou extremidades, não cirúrgico                             | 22  | 15,94 |
| AVC isquêmico  | 13  | 9,42  |
| Trauma cranioencefálico, não cirúrgico                                       | 9   | 6,52  |
| Hemorragia intracerebral espontânea  | 8   | 5,80  |
| Pneumonia Nosocomial   | 5   | 3,62  |
| Insuficiência renal crônica agudizada  | 3   | 2,17  |
| Cetoacidose diabética  | 3   | 2,17  |
| Síncope  | 3   | 2,17  |
| Pneumonia comunitária  | 3   | 2,17  |
| Infecção urinária sintomática, não especificada                              | 2   | 1,45  |
| Doença litíásica biliar  | 2   | 1,45  |
| Outras anemias   | 2   | 1,45  |
| Hemorragia digestiva alta  | 2   | 1,45  |
| PCR extra-hospitalar, não especificada                                       | 2   | 1,45  |
| Edema agudo de pulmão  | 2   | 1,45  |
| Infarto anterior miocárdico com supra de ST                                  | 2   | 1,45  |
| Transtornos convulsivos, não-especificado                                    | 2   | 1,45  |
| Hemorragia subaracnóidea traumática  | 2   | 1,45  |
| Pneumonite por aspiração   | 2   | 1,45  |
| Ferimento por projétil de arma de fogo, não cirúrgico                        | 2   | 1,45  |
| Outros   | 47  | 34,06 |
| <b>Diagnósticos secundários mais frequentes - Internações clínicas(n, %)</b> | 413 |       |
| Lesão por pressão (úlceras por pressão)                                      | 40  | 9,69  |
| Sepse e choque séptico   | 34  | 8,23  |
| Hemiplegia, paraplegia e tetraplegia   | 19  | 4,60  |

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| Outra insuficiência ou desconforto respiratório agudo | 16  | 3,87  |
| Insuficiência renal aguda                             | 14  | 3,39  |
| Pneumonia Nosocomial                                  | 11  | 2,66  |
| Derrame pleural                                       | 11  | 2,66  |
| Coma / torpor   | 11  | 2,66  |
| Infecção urinária sintomática, não especificada       | 11  | 2,66  |
| Trauma cranioencefálico, não cirúrgico                | 11  | 2,66  |
| Hematoma / Higroma subdural traumático                | 9   | 2,18  |
| Pneumonia comunitária                                 | 8   | 1,94  |
| Outras anemias  | 8   | 1,94  |
| Hematoma / Higroma subdural espontâneo                | 7   | 1,69  |
| Pneumonite por aspiração                              | 7   | 1,69  |
| Pneumotórax   | 7   | 1,69  |
| Hemorragia intracerebral espontânea                   | 6   | 1,45  |
| Infecção de partes moles                              | 6   | 1,45  |
| Hidrocefalia  | 6   | 1,45  |
| Outras complicações cardiovasculares                  | 6   | 1,45  |
| Outros  | 165 | 39,95 |

\* Internações novas no período.

| <b>Tabela 05 - Diagnóstico Mais Frequente - Todas as Internações Cirúrgicas</b>          | <b>N</b>   | <b>%</b> |
|--|------------|----------|
| Novas internações - Todas as internações cirúrgicas (n)                                  | 188        |          |
| <b>Categorias de diagnóstico - Todas as internações cirúrgicas (n, %)</b>                | <b>109</b> |          |
| <b>Procedimentos Cirúrgicos</b>  | <b>109</b> | 100,00   |
| Neurocirurgias   | 29         | 26,61    |
| Cirurgias ortopédicas  | 24         | 22,02    |
| Cirurgias de pulmão, traqueia e brônquios  | 17         | 15,60    |
| Cirurgias da pele e tecidos moles  | 9          | 8,26     |
| Cirurgias abdominais / retroperitônio  | 7          | 6,42     |
| Cirurgias do cólon, sigmoide, reto e canal anal  | 5          | 4,59     |
| Procedimentos invasivos (exceto cardiovascular)  | 5          | 4,59     |
| Cirurgias torácicas, outras  | 5          | 4,59     |
| Cirurgias do fígado, vias biliares e pâncreas  | 2          | 1,83     |
| Cirurgias vasculares   | 1          | 0,92     |
| Cirurgias de coluna  | 1          | 0,92     |
| Cirurgias oftalmológicas   | 1          | 0,92     |
| Politrauma cirúrgico   | 1          | 0,92     |
| Outras Cirurgias   | 1          | 0,92     |
| Cirurgias cardíacas para cardiopatias congênitas   | 1          | 0,92     |
| <b>Diagnósticos principais mais frequentes - Todas as internações cirúrgicas (n, %)</b>  | <b>49</b>  |          |
| <b>Procedimentos Cirúrgicos</b>  | <b>49</b>  | 100,00   |
| Laparotomia exploradora  | 7          | 14,29    |
| Osteossíntese do fêmur   | 6          | 12,24    |
| Craniectomia descompressiva unilateral   | 5          | 10,20    |
| Drenagem de hematoma subdural  | 5          | 10,20    |
| Drenagem de hematoma intraparenquimatoso   | 4          | 8,16     |
| Drenagem de hematoma extradural  | 3          | 6,12     |
| Outros debridamentos de tecidos moles e de pele  | 2          | 4,08     |
| Amputações de membros inferiores   | 2          | 4,08     |
| Artroplastia do quadril  | 2          | 4,08     |
| Derivação ventricular externa  | 2          | 4,08     |
| Ligadura de vaso periférico  | 1          | 2,04     |
| Outras cirurgias ortopédicas   | 1          | 2,04     |
| Cranioplastias   | 1          | 2,04     |
| Neurocirurgia, tumor cerebral ou intracraniano   | 1          | 2,04     |
| Outras neurocirurgias  | 1          | 2,04     |
| Traqueostomia  | 1          | 2,04     |
| Colecistectomia  | 1          | 2,04     |
| Colostomias  | 1          | 2,04     |
| Politrauma, tratamento cirúrgico   | 1          | 2,04     |
| Outras cirurgias cardíacas para cardiopatias congênitas                                  | 1          | 2,04     |
| Linfadenectomias   | 1          | 2,04     |
| <b>Diagnósticos secundários mais frequentes - Todas as internações cirúrgicas (n, %)</b> | <b>60</b>  |          |
| <b>Procedimentos Cirúrgicos</b>  | <b>60</b>  | 100,00   |
| Traqueostomia  | 16         | 26,67    |
| Osteossíntese do fêmur   | 6          | 10,00    |
| Toracostomia   | 5          | 8,33     |

|   |   |      |
|---|---|------|
| Outros debridamentos de tecidos moles e de pele                 | 4 | 6,67 |
| Endoscopia digestiva alta                                       | 4 | 6,67 |
| Artroplastia do quadril   | 4 | 6,67 |
| Colectomia parcial  | 3 | 5,00 |
| Sutura de ferida  | 2 | 3,33 |
| Derivação ventricular externa                                   | 2 | 3,33 |
| Drenagem de hematoma intraparenquimatoso                        | 2 | 3,33 |
| Drenagem de hematoma subdural                                   | 2 | 3,33 |
| Amputações de membros inferiores                                | 2 | 3,33 |
| Outras neurocirurgias   | 1 | 1,67 |
| Artrodese da coluna cervical                                    | 1 | 1,67 |
| Colostomias   | 1 | 1,67 |
| Colecistectomia   | 1 | 1,67 |
| Outras cirurgias de pálpebras                                   | 1 | 1,67 |
| Outras cirurgias ortopédicas                                    | 1 | 1,67 |
| Debridamento de úlceras por pressão                             | 1 | 1,67 |
| Endoscopia digestiva baixa, colonoscopia ou retossigmoidoscopia | 1 | 1,67 |

\* Novas internações na unidade durante o período.

| <b>Tabela 06 - Diagnóstico Mais Frequente - Internações Cirúrgicas Eletivas *</b>       | <b>N</b>  | <b>%</b>      |
|---|-----------|---------------|
| Novas internações - Cirurgias eletivas (n)  | 188       |               |
| <b>Categorias de diagnóstico - Internações cirúrgicas eletivas (n, %)</b>               | <b>87</b> |               |
| <b>Procedimentos Cirúrgicos</b>   | <b>87</b> | <b>100,00</b> |
| Cirurgias ortopédicas   | 22        | 25,29         |
| Cirurgias de pulmão, traqueia e brônquios   | 17        | 19,54         |
| Neurocirurgias  | 15        | 17,24         |
| Cirurgias da pele e tecidos moles   | 7         | 8,05          |
| Cirurgias abdominais / retroperitônio   | 6         | 6,90          |
| Cirurgias do cólon, sigmoide, reto e canal anal   | 5         | 5,75          |
| Procedimentos invasivos (exceto cardiovascular)   | 5         | 5,75          |
| Cirurgias torácicas, outras   | 3         | 3,45          |
| Cirurgias do fígado, vias biliares e pâncreas   | 2         | 2,30          |
| Cirurgias de coluna   | 1         | 1,15          |
| Cirurgias oftalmológicas  | 1         | 1,15          |
| Politrauma cirúrgico  | 1         | 1,15          |
| Outras Cirurgias  | 1         | 1,15          |
| Cirurgias cardíacas para cardiopatias congênitas  | 1         | 1,15          |
| <b>Diagnósticos principais mais frequentes - Internações cirúrgicas eletivas(n, %)</b>  | <b>32</b> |               |
| <b>Procedimentos Cirúrgicos</b>   | <b>32</b> | <b>100,00</b> |
| Osteossíntese do fêmur  | 6         | 18,75         |
| Laparotomia exploradora   | 6         | 18,75         |
| Outros debridamentos de tecidos moles e de pele   | 2         | 6,25          |
| Amputações de membros inferiores  | 2         | 6,25          |
| Artroplastia do quadril   | 2         | 6,25          |
| Craniectomia descompressiva unilateral  | 2         | 6,25          |
| Drenagem de hematoma subdural   | 2         | 6,25          |
| Neurocirurgia, tumor cerebral ou intracraniano  | 1         | 3,13          |
| Outras neurocirurgias   | 1         | 3,13          |
| Traqueostomia   | 1         | 3,13          |
| Colecistectomia   | 1         | 3,13          |
| Colostomias   | 1         | 3,13          |
| Derivação ventricular externa   | 1         | 3,13          |
| Drenagem de hematoma intraparenquimatoso  | 1         | 3,13          |
| Politrauma, tratamento cirúrgico  | 1         | 3,13          |
| Outras cirurgias cardíacas para cardiopatias congênitas                                 | 1         | 3,13          |
| Linfadenectomias  | 1         | 3,13          |
| <b>Diagnósticos secundários mais frequentes - Internações cirúrgicas eletivas(n, %)</b> | <b>55</b> |               |
| <b>Procedimentos Cirúrgicos</b>   | <b>55</b> | <b>100,00</b> |
| Traqueostomia   | 16        | 29,09         |
| Osteossíntese do fêmur  | 6         | 10,91         |
| Outros debridamentos de tecidos moles e de pele   | 4         | 7,27          |
| Endoscopia digestiva alta   | 4         | 7,27          |
| Artroplastia do quadril   | 4         | 7,27          |
| Toracostomia  | 3         | 5,45          |
| Colectomia parcial  | 3         | 5,45          |
| Derivação ventricular externa   | 2         | 3,64          |



---

|   |   |      |
|---|---|------|
| Drenagem de hematoma intraparenquimatoso                        | 2 | 3,64 |
| Drenagem de hematoma subdural                                   | 2 | 3,64 |
| Outras neurocirurgias   | 1 | 1,82 |
| Artrodese da coluna cervical                                    | 1 | 1,82 |
| Colostomias   | 1 | 1,82 |
| Amputações de membros inferiores                                | 1 | 1,82 |
| Colecistectomia   | 1 | 1,82 |
| Outras cirurgias de pálpebras                                   | 1 | 1,82 |
| Outras cirurgias ortopédicas                                    | 1 | 1,82 |
| Debridamento de úlceras por pressão                             | 1 | 1,82 |
| Endoscopia digestiva baixa, colonoscopia ou retossigmoidoscopia | 1 | 1,82 |

---

\* Novas internações na unidade durante o período.

| <b>Tabela 07 - Diagnóstico Mais Frequente - Internações Cirúrgicas de Emergência *</b>       | <b>N</b>  | <b>%</b>      |
|--|-----------|---------------|
| Novas internações - Cirurgias de emergência (n)  | 188       |               |
| <b>Categorias de diagnóstico - Internações cirúrgicas de emergência (n, %)</b>               | <b>19</b> |               |
| <b>Procedimentos Cirúrgicos</b>  | <b>19</b> | <b>100,00</b> |
| Neurocirurgias   | 14        | 73,68         |
| Cirurgias torácicas, outras  | 2         | 10,53         |
| Cirurgias vasculares   | 1         | 5,26          |
| Cirurgias ortopédicas  | 1         | 5,26          |
| Cirurgias abdominais / retroperitônio  | 1         | 5,26          |
| <b>Diagnósticos principais mais frequentes - Internações cirúrgicas de emergência(n, %)</b>  | <b>17</b> |               |
| <b>Procedimentos Cirúrgicos</b>  | <b>17</b> | <b>100,00</b> |
| Craniectomia descompressiva unilateral   | 3         | 17,65         |
| Drenagem de hematoma extradural  | 3         | 17,65         |
| Drenagem de hematoma intraparenquimatoso   | 3         | 17,65         |
| Drenagem de hematoma subdural  | 3         | 17,65         |
| Ligadura de vaso periférico  | 1         | 5,88          |
| Outras cirurgias ortopédicas   | 1         | 5,88          |
| Laparotomia exploradora  | 1         | 5,88          |
| Cranioplastias   | 1         | 5,88          |
| Derivação ventricular externa  | 1         | 5,88          |
| <b>Diagnósticos secundários mais frequentes - Internações cirúrgicas de emergência(n, %)</b> | <b>2</b>  |               |
| <b>Procedimentos Cirúrgicos</b>  | <b>2</b>  | <b>100,00</b> |
| Toracostomia   | 2         | 100,00        |

\* Novas internações na unidade durante o período.

| <b>Tabela 08 - Principais Comorbidades e Capacidade Funcional à Internação na Unidade - Todas as Internações Novas na Unidade *</b> | <b>N</b> | <b>%</b> |
|---|----------|----------|
| Internações novas (n)   | 188      |          |
| Pacientes com comorbidades (n, %)   | 134      | 71,28    |
| Comorbidades mais graves (n, %)   |          |          |
| Tumor sólido, locorregional   | 9        | 4,79     |
| Em diálise  | 7        | 3,72     |
| Sem diálise   | 6        | 3,19     |
| Tumor sólido, metastático   | 3        | 1,60     |
| Imunossupressão   | 3        | 1,60     |
| DPOC grave  | 3        | 1,60     |
| NYHA Classes II-III   | 2        | 1,06     |
| SIDA  | 2        | 1,06     |
| NYHA Classe IV  | 1        | 0,53     |
| Outras comorbidades mais frequentes (n, %)  |          |          |
| Hipertensão Arterial  | 98       | 52,13    |
| Diabetes s/ complicação   | 42       | 22,34    |
| Demência  | 15       | 7,98     |
| Alcoolismo  | 15       | 7,98     |
| Tabagismo (nos últimos 12 meses)  | 13       | 6,91     |
| AVC sem sequela   | 11       | 5,85     |
| Doença psiquiátrica   | 9        | 4,79     |
| IAM prévio  | 6        | 3,19     |
| Diabetes c/ complicação   | 6        | 3,19     |
| AVC com sequela   | 4        | 2,13     |
| Obesidade mórbida   | 4        | 2,13     |
| Hipotireoidismo   | 3        | 1,60     |
| Dça. ulcerosa péptica   | 2        | 1,06     |
| Doença arterial periférica  | 2        | 1,06     |
| Fibrilação atrial crônica   | 1        | 0,53     |
| Outras arritmias cardíacas  | 1        | 0,53     |
| Índice de Comorbidades de Charlson (pontos)   |          |          |
| Média ± DP  | 0,94     | 1,55     |
| Mediana   | 0,00     |          |
| Capacidade funcional prévia (n, %)  |          |          |
| Independente  | 157      | 83,51    |
| Necessidade de assistência  | 30       | 15,96    |
| NI  | 1        | 0,53     |
| Índice Modificado de Fragilidade (Modified Frailty Index, MFI)  |          |          |
| MFI (escore) (média, DP)  | 0,11     | 0,10     |
| MFI (pontos) (média ± DP)   | 1,17     | 1,14     |
| Classificação pelo MFI (pontos) (n, %)  |          |          |
| Não frágil (MFI=0)  | 66       | 35,11    |
| Pré-frágil (MFI=1-2)  | 97       | 51,60    |
| Frágil (MFI>=3)   | 25       | 13,30    |

\* Novas internações na unidade durante o período.

| <b>Tabela 09 - Procedimentos e Medidas de Suporte Invasivo Durante a Internação na UTI - Todos os Pacientes Egressos da Unidade *</b> | <b>N</b> | <b>%</b> |
|---|----------|----------|
| Número total de saídas da unidade (altas + óbitos) (n)  | 188      |          |
| Medidas de suporte invasivo na unidade (n, %)   |          |          |
| Ventilação não-invasiva   | 0        | 0,00     |
| Falha da VNI  | 0        | 0,00     |
| Ventilação mecânica   | 54       | 28,72    |
| Duração da vent. mecânica (dias) (média ± DP)   | 7        | 4,22     |
| Duração da vent. mecânica (dias) (mediana)  | 5        |          |
| Faixa de duração da VM (dias) (n,%)   |          |          |
| <=1   | 10       | 5,32     |
| 2 - 3   | 5        | 2,66     |
| 4 - 7   | 13       | 6,91     |
| 8 - 14  | 9        | 4,79     |
| 15 - 20   | 1        | 0,53     |
| 21 - 30   | 3        | 1,60     |
| Dias livres de vent. Mecânica (média ± DP)  | 5        | 9,67     |
| Dias livres de vent. Mecânica (mediana)   | 0        |          |
| Traqueostomia   | 5        | 2,66     |
| Aminas  | 55       | 29,26    |
| Suporte renal   | 17       | 9,04     |
| Intermitente (IHD)  | 6        | 3,19     |
| Não informado   | 1        | 0,53     |
| Duração da diálise/suporte renal (dias) (média ± DP)  | 9        | 11,56    |
| Duração da diálise/suporte renal (dias) (mediana)   | 4        |          |
| Faixa de duração da diálise/suporte renal (dias) (n,%) (n,%)  |          |          |
| <=1   | 1        | 0,53     |
| 2 - 3   | 2        | 1,06     |
| 4 - 7   | 2        | 1,06     |
| 8 - 14  | 2        | 1,06     |
| 21 - 30   | 1        | 0,53     |
| > 30  | 1        | 0,53     |
| Cateter venoso central  | 82       | 43,62    |
| Cateter vesical   | 51       | 27,13    |
| Cateter de Swan-Ganz  | 0        | 0,00     |
| Cateter arterial  | 59       | 31,38    |
| Marcapasso  | 0        | 0,00     |
| Nutrição parenteral   | 0        | 0,00     |
| Balão intra-aórtico (BIA)   | 0        | 0,00     |
| Monitoração hemodinâmica minimamente invasiva   | 0        | 0,00     |
| Proteína C ativada  | 0        | 0,00     |
| Fator VIIa  | 0        | 0,00     |
| Complexo protrombínico  | 0        | 0,00     |
| Trombolíticos   | 0        | 0,00     |
| Hemotransusão   | 16       | 8,51     |
| Concentração de hemácias  | 16       | 8,51     |
| Plasma  | 0        | 0,00     |
| Concentração de plaquetas   | 0        | 0,00     |

Período: 01/01/2024 - 31/01/2024 - Instituição: Rede SES RJ; Capital; Hospital Estadual Getúlio Vargas; UPO, UTI I, UTI II, UTI III, UTI IV -

|  |   |      |
|--|---|------|
| Crioprecipitado                              | 0 | 0,00 |
| Outros hemocomponentes                       | 0 | 0,00 |
| Óxido nítrico                                | 0 | 0,00 |
| PIC – Monitorização da Pressão Intracraniana | 0 | 0,00 |
| Cateter de microdiálise                      | 0 | 0,00 |
| Derivação ventricular externa                | 2 | 1,06 |
| Cateter de PtiO2                             | 0 | 0,00 |
| Cateter de mensuração da SjVO2               | 0 | 0,00 |
| ECMO   | 0 | 0,00 |
| Hipotermia terapêutica                       | 0 | 0,00 |
| Plasmaferese                                 | 0 | 0,00 |
| Concentrado de Fibrinogênio liofilizado      | 0 | 0,00 |
| Diálise peritoneal (Cateter Tenckhoff)       | 0 | 0,00 |
| Cânula nasal de alto fluxo (CNAF)            | 0 | 0,00 |

\* Pacientes com desfechos na unidade (vivo + óbitos) anotados durante o período.

| <b>Tabela 10 - Principais Desfechos na Unidade - Todos os Pacientes Egressos da Unidade *</b>       | <b>N</b> | <b>%</b> |
|---|----------|----------|
| Número total de saídas da unidade (altas + óbitos) (n)  | 188      |          |
| Idade (anos) (média ± DP)   | 59,43    | 21,18    |
| Idade (anos) (mediana)  | 63       |          |
| Tipo de Internação (n, %)   |          |          |
| Clínico   | 142      | 75,53    |
| Cirurgia eletiva  | 29       | 15,43    |
| Cirurgias de urgência / emergência  | 17       | 9,04     |
| Tempo entre a decisão da alta e a saída da Unidade (horas) (média ± DP)                             |          |          |
| Média ± DP  | 0,20     | 1,03     |
| Mediana   | 0,00     |          |
| Percentil 90  | 0,00     |          |
| Percentil 95  | 0,70     |          |
| Maior valor   | 7        |          |
| Faixas de tempo entre a decisão da alta e a saída da Unidade (horas)                                |          |          |
| <= 4h   | 124      | 86,11    |
| >4 – 12h  | 3        | 2,08     |
| NI  | 17       | 11,81    |
| Pacientes com atraso da saída da UTI após a decisão para a alta (> 4h) (n, %)                       | 3        | 2,08     |
| Motivo para o atraso da saída da UTI após a decisão para a alta (somente pacientes com > 4h) (n, %) |          |          |
| Não informado   | 3        | 100,00   |
| Dias evitáveis na UTI (n)   | 0        |          |
| Taxa de dias evitáveis na UTI (%)   |          | 0,02     |
| Duração da internação na unidade (dias) (média ± DP)  | 8,41     | 11,15    |
| Duração da internação na unidade (dias) (mediana)   | 5        |          |
| Faixas de duração da internação na unidade (dias) (n, %)  |          |          |
| <=1   | 22       | 11,70    |
| 2 - 3   | 51       | 27,13    |
| 4 - 7   | 52       | 27,66    |
| 8 - 14  | 37       | 19,68    |
| 15 - 20   | 12       | 6,38     |
| 21 - 30   | 6        | 3,19     |
| > 30  | 8        | 4,26     |
| Destino (n, %)  |          |          |
| Enfermaria ou quarto (n, %)   | 122      | 64,89    |
| Outra UTI/UCI do hospital (n, %)  | 9        | 4,79     |
| Outro hospital (n, %)   | 10       | 5,32     |
| Óbito (n, %)  | 44       | 23,40    |
| Residência (n, %)   | 3        | 1,60     |
| Modelo Resolução CFM de 2016 (internações até 01/01/2017)   |          |          |
| Não avaliado / não informado  | 188      | 100,00   |
| Decisão para cuidados paliativos (n, %)   |          |          |
| Não   | 180      | 95,74    |
| Sim, não intensificar   | 2        | 1,06     |
| Sim, limitar  | 5        | 2,66     |
| Sim, retirar  | 1        | 0,53     |
| Sim, ordem de não ressuscitação cardiopulmonar apenas (ONR)   | 0        | 0,00     |

|  |        |            |
|--|--------|------------|
| Tempo até a decisão para cuidados paliativos (dias) (n, %)           |        |            |
| 8 - 20   | 3      | 37,50      |
| >=21   | 5      | 62,50      |
| Desfecho na Unidade (n, %)   |        |            |
| Alta   | 144,00 | 76,60      |
| Óbito  | 44,00  | 23,40      |
| Escores de prognóstico à internação (média ± DP)                     |        |            |
| Média ± DP   | 45,12  | 11,88      |
| Maior valor  | 80     |            |
| Menor valor  | 19     |            |
| Mortalidade predita pelo SAPS 3 (%) (Média ± DP)                     | 15,40  | 15,75      |
| Taxa de mortalidade padronizada (TMP, IC 95%) (observado / esperado) | 1,52   | (1,1-2,04) |

\* Pacientes com desfechos na unidade (vivo + óbitos) anotados durante o período.

§ IMPORTANTE: Os escores de prognóstico estimam a probabilidade de óbito hospitalar. Portanto, é necessário cautela na interpretação da taxa de letalidade padronizada da unidade.

\*\* Taxa de dias de UTI evitáveis = somatório dos dias de atraso na saída da UTI após a decisão de alta / somatório de pacientes-dia na UTI no período. O excesso de tempo entre a decisão para a alta da UTI e a efetiva saída do paciente da unidade superior a 04 horas é considerado evitável. Assim, o conceito de dias de UTI evitáveis reflete a quantidade de tempo que os pacientes gastam ocupando um leito de UTI quando eles não necessitam mais de cuidados intensivos. Ele pode ser usado para medir e identificar eventuais problemas no fluxo direto de saída dos pacientes da UTI, o que pode representar ganhos potenciais de eficiência

| <b>Tabela 11 - Principais Desfechos no Hospital - Todos os Pacientes Egressos do Hospital *</b> | <b>N</b> | <b>%</b>    |
|---|----------|-------------|
| Saídas hospitalares (n)   | 144      |             |
| Idade (anos) (média ± DP)   | 59,13    | 21,48       |
| Tipo de Internação (n, %)   |          |             |
| Clínico   | 109      | 50,46       |
| Cirurgia eletiva  | 19       | 8,80        |
| Cirurgias de urgência / emergência  | 13       | 6,02        |
| Duração da internação hospitalar (dias) (média ± DP)  | 13,69    | 13,95       |
| Duração da internação hospitalar (dias) (mediana)   | 9        |             |
| Destino (n, %)  |          |             |
| Residência  | 85       | 59,03       |
| Outro hospital  | 11       | 7,64        |
| Óbito   | 48       | 33,33       |
| Desfecho no hospital (n, %)   |          |             |
| Alta  | 96       | 66,67       |
| Óbito   | 48       | 33,33       |
| Escores de prognóstico à internação (média ± DP)  |          |             |
| SAPS 3 (pontos) - Média ± DP  | 44,23    | 11,67       |
| Maior valor   | 80       |             |
| Menor valor   | 19       |             |
| Mortalidade predita pelo SAPS 3 (%) (Média ± DP)  | 14,24    | 15,15       |
| Taxa de mortalidade padronizada (TMP, IC 95%) (observado / esperado)                            | 2,36     | (1,76-3,09) |
| Modelo Epimed de Predição de Mortalidade (EPM Mortalidade)                                      |          |             |
| Mortalidade predita pelo EPM (%) (Média ± DP)   | 13,57    | 17,20       |
| Taxa de mortalidade padronizada (TMP, IC 95%) (observado / esperado)                            | 2,47     | (1,85-3,24) |

\* Pacientes com desfechos no hospital (vivo + óbitos) anotados durante o período.